

OZG OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice LABORATORIJ za KLINIČNO BIOKEMIJO in HEMATOLOGIJO	SOP III.11.OBVLADOVANJE PREDANALITSKIH VIROV NAV: ANALNI BRIS (NAVODILO PACIENTOM) Veljavnost od: 17.03.2020
---	--

NAVODILO ZA ODVZEM ANALNEGA BRISA

Podančice (*Enterobius vermicularis*) ne odlagajo jajčec v črevesju, pač pa samice ponoči potujejo iz črevesa in odlagajo jajčeca na kožo, ki obdaja anus (zadnjik). Jajčeca odkrijemo s pregledom **analnega brisa** (to je odtis lepilnega traku z zadnjika in kože ob zadnjiku).

NAVODILO:

Analni bris je potrebno odvzeti zjutraj pred iztrebljanjem in umivanjem. Bris odzemi s **prozornim lepilnim trakom** tako, da s z njim dotaknete anusa (zadnjika) in presredka. Lepilni trak pazljivo nalepite na objektno stekelce.

Pod lepilnim trakom ne sme biti zračnih mehurčkov, sicer pod mikroskopom jajčec ne vidimo.

Pripravljen preparat čim prej prinesite v laboratorij..